520

PAPAVER
CORNICVLATVM.

Gelb ólmagen.

DE MECONE CERATITE

NOMINA.

MHKΩN κερατίτης Græcis, Papauer cor
uer cornutum, Germanis Gelb ólm
fructu, quem producit, cornu modo

FORMA.

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco simili
modo serrata: caulem etiam similem, florem lute
ut cornu inflexum, fœnigræci corniculo similen
pusillum, nigrum quale Papaueris. Radicem
gram, crassam.

LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis prou
stra non nisi satum fuerit nascitur.

TEMPVS.

Iunio floret mense. Semen autem circa messes

TEMPERAME

Calidum & siccum esse, facultates eius, & in g

VIRES. EX DIOS

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischia
test. His etiam qui crassas & araneosas faciunt u
sura cum aqua mulsa potum, aluum leniter pu
oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta
las emendant.

EX GAL

B Papauer corniculatū nominatum quidem est
te, ueluti & fœnumgræcū, ut bouis cornu simile
di & abstergendi. Proinde radix herbæ in aqua
fectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodun
his abstinere oportet ulceribus iam purgatis: ade
ræ quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc faculta
sed & crustam ulceribus detrahit.

EX PLI

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in m
iumentorū sanant. Radix acetabuli mensura coc
datur ad lumborum uitia & iecinoris. Carbunc

DE MORO CA

NOMINA.

MOPEA, ἡ συκάμινέα Græcis, Morus L
barijs Morus celsi, Germanis Mau

FORMA.

Morus arbor notior est quàm ut
tunda ferè habet, nisi quod in summo sint acumi
Menthæ hortensis primi & secundi generis folia
ctum statim ab ortu candidum, cum pubescit r
est certè silentio transeundum, quod Mori folijs
liarum exortu usq; ad solstitiū pasti uermiculi, q
ac Seres nominantur, sericeū uellus, quo turget
ciunt: nulla enim in re alia natura sagacior depi
pisse uidebitur, in quo ingeniosius laborauerit,